

Kritiska kliniska larm och flöden

De kritiska kliniska larmtyperna är framtagna utifrån verksamheternas behov. Larmen tas emot på mobiltelefon. Nedan beskrivs de olika larmtyper som finns i RJH, vilka funktioner som tillkallas och när de används.

För exakta flöden med tidsscheman se Centuridokument: [Larmtyper m flöden - 251009.xlsx](#) (ej klart än)

PJ = Primärjour, BJ = Bakjour

Larmtyp (benämning)	Vilka funktioner tillkallas (larmflöde)	Användning
Salslarm	Anestesi PJ Planering C-OP Anestesi ssk x2 OP ssk OP usk Anestesi usk	Mer kompetens / händer önskas omgående till plats där narkos pågår, exv oväntad svår luftväg på OP-sal eller utgård
Narkoslarm	Anestesi PJ Planering C-OP Anestesi ssk	Narkoskompetens (läk+ssk) önskas omgående, ex allergisk reaktion på röntgen
Trauma 1	Anestesi PJ Kirurgi PJ Ortopedi PJ Röntgen PJ/BJ Kirurgi BJ Anestesi ssk IVA ssk Op ssk Akm ssk+usk x2 Lab/blodcentral	Då traumatiskt skadad patient ankommer till akutmottagningen som sviktar i sina vitalparametrar eller har allvarliga skador.
Trauma 2	Anestesi PJ Kirurgi PJ Ortopedi PJ Anestesi ssk AKM ssk x2 AKM usk Lab/blodcentral	Då traumatiskt skadad patient ankommer till akutmottagningen där hög misstanke finns om allvarliga skador.
OB Blöd 30	Anestesi PJ Förlossning PJ OP-planering OP entré ssk Anestesi ssk OP-ssk AKM-ssk Allén usk Anestesi usk OP-usk AKM-usk	Obstetrisk blödning, åtgärd på OP

Sectio 30	Anestesi PJ+BJ Förlossning PJ Neo PJ OP-planering OP entré ssk Anestesi ssk OP ssk Neo ssk AKM-ssk Allén usk Anestesi usk OP usk Neo-usk AKM-usk	Subakut kejsarsnitt
Sectio OMB	Anestesi PJ+BJ Förlossning PJ Neo PJ OP-planering OP entré ssk Anestesi ssk OP ssk Neo ssk AKM-ssk Allén usk Anestesi usk OP usk Neo-usk AKM-usk	Akut kejsarsnitt
Akutlarm	Anestesi PJ Medicin PJ HIA ÖI + UI (Dagtid) Anestesi ssk HIA ssk-Hjärtcykel	En patient eller medarbetare drabbas av ett medicinskt tillstånd som kräver omedelbar handläggning av ett akutmedicinskt team
Hjärtlarm vuxen	Anestesi PJ Medicin PJ HIA ÖI (Dagtid) Anestesi ssk AKM ssk + usk	Hjärtstillestånd AKM
Hjärtstopp barn	Anestesi PJ Medicin PJ HIA ÖI (dagtid) Barn PJ Barn BJ (dagtid) Anestesi ssk AKM ssk + usk	Hjärtstillestånd AKM
Sepsis	Anestesi PJ Inf läk (dagtid) Medicin PJ Evt klinik PJ AKM ssk	Patient erfar misstänkt eller konstaterad sepsis
Rädda Hjärnan	Medicin PJ Strokeläkare Stroke ssk RTG PJ RTG ssk	Patient erfar symtom förenligt med stroke. Utlöses primärt av Stroke ssk

Samling AKM	AKM-ssk AKM-usk AKM anhörigmottagare	Används lokalt på AKM för att samla berörd personal.
Neo larm	Anestesi PJ Neo PJ Neo-ssk Neo-usk	Kritiskt sjuk nyfödd
Sjukt barn	Anestesi PJ + BJ Barn PJ + BJ Neo PJ	Kritiskt sjukt barn AKM
EKG	HIA ÖI-UI. Medicin PJ	Ambulans skickar EKG för bedömning av läkare
IVA larm	Anestesi PJ IVA-ssk	
Primärjournslarm (12)	Respektive verksamhets primärjour	Larma berörd primärjour
MIG larm		Mobil Intensivvårds Grupp, MIG, är en resurs i omhändertagandet av kritisk sjuka patienter på vårdavdelningar. MIG ersätter inte hjärtstopsteamet. Hjärtlarma vid akut behov av hjälp, till exempel anafylaktiska reaktioner och hjärtstopp.
Stabsläge		Innebär att regional/lokal nivå informerar sig om läget, följer händelseutvecklingen och vidtar de förberedande åtgärder som anses nödvändiga
Förstärkningsläge		Innebär att regional/lokal särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för punktförstärkning av viktiga funktioner och stödfunktioner
Katastrofläge		Innebär att regional/lokal särskild sjukvårdsledning mobiliserar alla tillgängliga funktioner och resurser som krävs för att hantera den särskilda händelsen