

Vätskebrist och läkemedel

Läkemedelsjusteringar vid dehydrering

Detta informationsmaterial riktar sig till

-dig som är läkare som stöd för att utföra
läkemedelsjusteringar vid dehydrering.

- dig som är sjuksköterska för att identifiera och
vid behov, pausa riskläkemedel vid
dehydrering.

Kontakta läkare så snart som möjligt.

Här ges exempel på läkemedel där kortvarigt
behandlingsuppehåll bör göras tills
dehydreringen är behandlad, samt läkemedel
där uppehåll inte bör göras



Läkemedelsjusteringar vid dehydrering

När en patient blir dehydrerad på grund av kortare episod med diarré, kräkningar, feber, dåligt vätskeintag eller värmebölja bör läkemedelsbehandlingen ses över.

Här listas vanliga läkemedel där man bör göra ett kort uppehåll respektive behålla behandlingen tills den aktuella situationen är stabiliserad. Listorna visar exempel och är inte heltäckande.

Rekommendationerna ersätter inte en individuell bedömning av patientens sammantagna läkemedelsbehandling. Kontakta läkare så snart som möjligt. För information om läkemedel som kan ge problem vid värmebölja, se www.folkhalsomyndigheten.se

Exempel på läkemedel där uppehåll bör göras



Diabetesläkemedel

- Metformin samt kombinationer
- Insulinfrisättare ex glimepirid, repaglinid (Novonorm)
- SGLT2-hämmare ex empagliflozin (Jardiance), dapagliflozin (Forxiga) samt kombinationer

Läkemedel för hjärta och kretslopp

- Digitalisglykosid digoxin (ex Digoxin BioPhausia, Lanoxin)
- Diuretika ex bendroflumetazid (Salures), furosemid (ex Furix, Impugan, Lasix retard), hydroklortiazid (ex Esidrex)
- Aldosteronantagonister spironolakton, eplerenon (Inspra)
- ACE-hämmare ex enalapril, ramipril
- Angiotensinreceptorblockerare ex kandesartan, losartan

Antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel

- COX-hämmare (NSAID) ex naproxen, ibuprofen, celecoxib
- Giktmedel kolkicin (ex Colchimex, Colrefuz)

Psykofarmaka

- Litium (ex Lithionit) – Kontakta psykiatrin först!

Exempel på läkemedel där uppehåll inte bör göras

Diabetesläkemedel

Dosen kan behöva ändras
Mät blodsockret

- Insuliner samt kombinationer

Antikoagulantia

Dosen kan behöva ändras

- Direktverkande orala antikoagulantia ex apixaban (Eliquis), dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto)
- Vitamin K-antagonist warfarin (ex Waran)
- Hepariner ex dalteparin (Fragmin), tinzaparin (Innohep)
- Övriga antitrombotiska medel fondaparinux (Arixtra)

Trombocythämmare

- ex acetylsalicylsyra (ex Trombyl), klopido­grel (ex Plavix), prasugrel (ex Efient), tikagrelor (Brilique)

Läkemedel för hjärta och kretslopp

Dosen kan behöva minskas

- Betablockare ex bisoprolol, metoprolol

Perorala kortikosteroider

Dosen kan behöva ökas

- ex prednisolon, betametason (Betapred), hydrokortison (ex Hydrokortison, Kortifarm, Solu-Cortef)

Sköldkörtelhormoner

- ex levotyroxin (Levaxin, Euthyrox)

Immunosuppressiva läkemedel

Kontakta specialistmottagning

- ex ciklosporin (ex Sandimmun), takrolimus (ex Adport, Prograf)

Antiepileptika

Överväg koncentrationsbestämning

- ex karbamazepin (ex Tegretol Retard), lamotrigin, levetiracetam, oxkarbazepin (ex Trileptal), valproinsyra (ex Ergenyl, Absenor)

Parkinsonläkemedel

- ex levodopa+enzymhämmare (ex Madopark, Sinemet)