

Ordinationsblad vid vaccination av personal mot mässling - dos 1 & 2

Namn..... Personnummer.....-..... Arbetsplats.....

Namnteckning..... Mailadress/Telefon..... Datum

Frågor inför vaccination	Ja	Nej
Är du gravid eller står du i begrepp att bli gravid? Vaccinera dig tidigast 1 månad efter förlossningen		
Är du överkänslig mot mässling/påssjuka/röda hund-vaccin eller mot något hjälpämne i vaccinet, inklusive neomycin?		
Har du mycket svår äggallergi som medfört allvarlig allergisk chock?		
Har du nedsatt immunförsvar av sjukdom eller behandling?		
Har du pågående infektion med feber över 38,5?		
Är du vaccinerad med annat levande försvagat vaccin senaste månaden: gula febern; BCG; vattkoppor?		
Har du fått blodtransfusion eller gammaglobulin senaste 3 månaderna?		

Ordination och signatur	Hö	Vä	
Inj. Priorix 0,5ml sc givet			Datum.....
			Batchnr:.....

	Ja
Serologi pga. kontraindikation	

Ordinerande läkare.....

Vaccinatör.....

Rekommenderas ytterligare 1 dos Priorix® efter ett intervall på minst 4 veckor. Två doser totalt ger ett fullgott skydd.	Ja	Nej