

**”Vad är det du söker för?”**

**Sexualanamnes**

Vilket kön har du, kroppsligt?

Vilket kön har de personer du haft sex med?

Vilken typ av sex har du erfarenhet av (sexuell praktik)?

Hur många personer har du haft sex med senaste 6–12 månader?

Har du haft sex med någon utomlands eller någon som kommer utomlands ifrån?

Har du erfarenhet av sex mot ersättning?

Hur fungerar det med kondom för patienten?

Behov av annat preventivumedel?

**”Tror du att du kan ha blivit utsatt för blodsmitta?”**

Använder du nu eller har du tidigare använt droger?

Använder eventuell partner droger?

Har du tatuert dig utomlands?

\*Om känd HIV-infektion eller hepatit B hos partner, kontakta snarast infektionsmottagningen

\*\* Vid stark misstanke om STI hos person med akuta urogenitala/ rektala symtom ta gonorréodling i tillägg eller hänvisa till hud- och STI-mottagningen.

Obs vid sexuella övergrepp ska patienten undersökas på sjukhuset

<https://rjh.centuri.se/RegNo/32045>

<https://rjh.centuri.se/RegNo/04640>

**1 Provtagning**

Symtomfri patient med enstaka sexpartner senaste 6–12 mån:

*Person med vagina:* Klamydia och gonorré PCR vaginalprov taget av patienten själv, om enbart oskyddat oralsex överväg provtagning från svalg

*Heterosexuell person med penis:* Klamydia och gonorré PCR urinprov, om enbart oskyddat oralsex överväg provtagning från svalg

Erbjud HIV-test\*

**2 Utvidgad provtagning**

1. Patient som haft flera sexpartners senaste 6–12 mån

2. För män som har sex med män (MSM)

3. Vid utomnordisk sexuell kontakt

4. Erfarenhet av sex mot ersättning

Klamydia och gonorré PCR, provtagning utifrån sexuell praktik

Symtomfri patient kan ta vaginalprov och rektalprov själv

Erbjud serologier\*: HIV, hepatit B samt syfilis (även hepatit C vid erfarenhet av sex mot ersättning)

**3\*\* Urogenitala/rektala symtom**

*Gynundersökning vid vaginala symtom som förändrad flytning och/eller olaga blödning:* Klamydia och gonorré PCR cervix/vaginalvägg, om miktionsssveda ta separat urinprov för klamydia och gonorré PCR

Obs glidslem kan försämra analysen, använd endast vatten på spekulum

*Vid symtom som miktionsssveda och/eller uretral flytning hos person med penis:* Klamydia och gonorré PCR urin

*Vid anamnes på receptivt analsex och symtom på proktit:*

Klamydia och gonorré PCR, proktoskop rek. för bedömning och vid provtagning Vattenbaserat sterilt glidmedel på proktoskopet antas inte försämra provtagning

Fortsatt övervägande av utredning och behandling utifrån symtom/fynd

**4 Droger/tatuering**

Erbjud serologier\*: HIV, hepatit B och hepatit C

Eller hänvisa till infektionsmottagningen alt. hud- och STI-mottagningen

**5 Anmodan gonorré**

Patient som via smittspårning eller partner uppmanats till gonorréprovtagning:

**Hänvisa i första hand till hud- och STI-mottagningen**

Provtagning: Klamydia och gonorré PCR samt gonorréodling utifrån sexuell praktik. Tänk på urin/uretra, cervix, rektalt och svalg