

## Sjukvårdsenheter i Sverige med pågående utbrott av multiresistenta bakterier (MRB) eller svamp

Uppdaterad: 2026-09-02

Om det framkommer att det finns aktuell spridning av MRB på den avsändande enheten behöver patienten alltid screenas.

Det är angeläget att frikostigt ta odlingsprov från sår hos alla patienter som läggs in på sjukhuset, även om antibiotika inte sätts in. Då ökar möjligheten till tidig upptäckt av MRB.

**OBS patient från något av sjukhusen med pågående utbrott nedan, provtas och isoleras i väntan på provsvar.**

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| <b>MRSA</b> | Screening på alla patienter från    |
|             | samtliga större neonatalavdelningar |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VRE</b> | Screening på alla patienter från                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sahlgrenska Universitetssjukhuset</li> <li>• Region Stockholm</li> <li>• Malmö</li> <li>• Trollhättan/Uddevalla</li> <li>• Kalmar Länssjukhus</li> <li>• Jönköping</li> <li>• Lund</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
|            | <p><b>Särskild regel för patienter som har vårdats på Sahlgrenska:</b></p> <p>Provtagning ska ske med eSwab-pinne (rosa kork) i stället för Copan pga. förekomst av VVE (vancomycin variabla enterokocker) som inte kan odlas fram i rutinscreening för VRE. Rutinodling för VRE utförs på Mikrobiologen i Östersund. VVE analysen utförs av externt lab.</p> <p>Det ska framgå i odlingsremissen att patienten har vårdats på Sahlgrenska.</p> |

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| <b>ESBL</b> | Screening på alla patienter från |
|             | Inget känt utbrott               |

|                |                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>C.auris</b> | Screening på alla patienter från                                      |
|                | Ett fall från Värmland, dvs inget utbrott. Screening är ändå aktuell. |

## Screening av patienter efter vård på sjukvårdsenheter utanför Sverige men inom Norden (Norge, Danmark, Finland, Åland, Färöarna och Grönland):

MRB-screening ska utföras rutinmässigt. Eventuellt undantag kan diskuteras med Vårdhygien.

## Screening av patienter och personal som varit inom sjukvård utanför Norden: MRB-screening ska alltid utföras.

För rutiner kring provtagning hänvisas till Centuri dokument nr. 80620:

[MRB - Multiresistenta bakterier, Rutindokument för Region Jämtland Härjedalen och kommunal vård och omsorg.](#)

För anvisning från vilka lokaler som ska screenas se tabellen nedan (urklipp från MRB-dokumentet). MRB-screening innebär provtagning från samtliga lokaler för alla bakterier som ingår i MRB-begreppet inkl. Candidozyma auris. Vid känt bärarskap eller specifik provtagning för något/några utvalda multiresistenta agens kan provtagning och beställning av analys begränsas.

|                                                        | Provlokal - obligatoriska |       |                |                    | Provlokal i förekommande fall utifrån riskfaktorer* |      |        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------|--------|
|                                                        | främre<br>näsöppning      | svalg | perineum       | rektum<br>(faeces) | sår,<br>hudlesion                                   | urin | övrigt |
| <b>MRB screening<br/>inkl. C. auris</b>                | X                         | X     | X              | X                  | X                                                   | X    | X      |
| <b>Smittspårning eller kontrollprov av känd bärare</b> |                           |       |                |                    |                                                     |      |        |
| MRSA                                                   | X                         | X     | X              |                    | X                                                   | X    | X      |
| VRE                                                    |                           |       |                | X                  | X                                                   | X    | X      |
| ESBLcarba                                              |                           |       |                | X                  | X                                                   | X    | X      |
| Karbapenemresistent<br>Acinetobacter                   |                           | X     | X              | X                  | X                                                   | X    | X      |
| Multiresistent<br>Pseudomonas                          |                           |       |                | X                  | X                                                   | X    | X      |
| Annan multiresistent<br>Gram-negativ bakterie          |                           |       |                | X                  | X                                                   | X    | X      |
| Candidozyma auris <sup>2</sup>                         | X                         |       | X<br>+ axiller |                    | X                                                   | X    | X      |

Riskfaktorer för spridning enl. punkt 2

Se även [provtagningsanvisningar från mikrobiologiska laboratoriet](#).

<sup>2</sup>Analys av C.auris utförs än så länge inte på mikrobiologiska laboratoriet i Östersund. Därför behöver det tas prov särskilt för det som ska skickas till Klinisk Mikrobiologi, Region Västerbotten, Umeå. Pappersremiss med gul kant. Inlämning och hantering enligt befintlig rutin.

Negativa screeningodlingar under pågående antibiotikabehandling ska återupprepas tidigast en vecka efter avslutad behandling.