

Rutin CDS Stroke prevention i Cosmic

Denna rutin utgör en komplettering till informationen i e-kursen 'CDS -Stroke Prevention' och nås via <https://elearning.cambio.se/> samt handbok [68569 CDS Stroke Prevention](#). Syftet med beslutsstödet är uppmärksamma läkare när en patient med diagnosen förmaksflimmer eller förmaksfladder ej behandlas i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer för att framför allt minska risk för stroke.

Arbetssätt

CDS Stroke prevention är tillgängligt för läkare inom primärvård RJH. Stödet aktiveras (en ikon tänds och en pop-up-ruta visas) när en patient med förmaksflimmer/-fladder hämtas i patientlisten som **inte behandlas enligt riktlinjer från Socialstyrelsen** (antikoagulantia saknas i läkemedelslistan samtidigt som diagnos förmaksflimmer eller -fladder finns registrerad). Genom att klicka på ikonen kan ytterligare information fås. Beslutsstödet räknar ut och presenterar CHA2DS2-VASc-poäng och risken för stroke.

Dessa varningar finns

- Patienten har inte medicinsk behandling som följer Socialstyrelsens riktlinjer vid förmaksflimmer.
- Patienten har ett tidigare beslut om att avstå behandling men har förändrad CHA2DS2-VASc-poäng.
- Patienten har ett tidigare beslut om att avstå behandling men tidsstämpeln är äldre än ett år.
- Patienten har fått sitt beslut uppskjutet men har förhöjd CHA2DS2-VASc-poäng jämfört med tidigare

Observera att CDS-Stroke inte känner av om patienten har behandling med antikoagulantia ordinerat i Pascal. I dessa fall ska ordinationen göras både i Pascal och i läkemedelslistan i Cosmic.

Att hantera aktiverad CDS Stroke prevention

Användaren ska alltid nyttja sin kliniska kompetens i kombination med beslutsstödet för att fatta beslut om adekvat handläggning.

Följande alternativ är möjliga:

- *Behandling inleds* enligt rekommendation. Recept förskrivs i läkemedelsmodulen (alternativt läggs in i läkemedelslistan vid dosdispenserade läkemedel), annars kommer varningen upp igen vid nästa kontakt.
- *Beslut skjuts upp*. Det är möjligt att skjuta upp beslutet ett specifikt tidsintervall. Beslutsstödet inaktiveras därmed under denna period för den aktuella patienten och aktiveras endas om CHA2DS2-VASc-poängen höjs. Att beslutet skjuts upp ska motiveras och signeras.
- *Beslutsstödet stängs utan signering*. Symbolen med CDS ligger då kvar i patientlisten och varningen visas när patienten hämtas nästa gång.
- *Beslut att inte behandla enligt rekommendation*. Om beslut fattas att patienten inte ska behandlas enligt rekommendation ska en motivering till beslutet dokumenteras via beslutsstödet så att beslutet visas i patientens journal samt att CDS-ikonen släcks.