



Kompressionsutrustning för cirkulationsproblem

Therese Gerlang



1 Förskrivare

Förskrivs av läkare som har god kännedom om kompressionsbehandling.

2 Kriterier

Kompressionsutrustningen för intermittent pneumatisk kompression (IPC) ger kliniskt effektivt dynamiskt tryck utan ingrepp på armar och ben för behandling av olika kärl- och lymfrelaterade problem.

Förskrivs då behandling med övrig kompression inte ger tillräcklig effekt vid:

- bensvullnad som orsakas av venös insufficiens
- ödem med måttlig arteriell insufficiens (ett alternativ när kvarliggande kompression inte tolereras på grund av smärta)
- arteriovenös insufficiens när kvarliggande kompression inte tolereras pga smärta
- hydrostatiskt inaktivitetsödem vid nedsatt/upphävd muskelpump på grund av pares eller nedsatt rörlighet av annan orsak
- lymfödem (måste kompletteras med kvarliggande kompressionsbandage)

3 Kontraindikationer

- Svår åderförkalkning eller annan ischemisk kärlsjukdom
- Obehandlat ödem pga hjärtsvikt
- Pågående, obehandlad infektion som ex erysipelas
- Känd eller misstänkt akut djup ventrombos
- Grav arteriell insufficiens utan ordination från kärlkirurg
- Ytlig artriell by-pass utan ordination från kärlkirurg
- Grav deformation av arm eller ben

4 Anvisning

Läkare ordinerar behandlingstryck, frekvens och behandlingstid samt ansvarar för uppföljning och utvärdering av behandling.

Förskrivande läkare informerar också muntligen och skriftligen patienten om behandlingstryck, behandlingsfrekvens och behandlingstid.

Enstaka behandlingar ger inte effekt.



5 Skötsel

Av hygieniska skäl ska plast användas mellan ben och kompressionsstövel. Stöveln tvättas och återanvänds, se bruksanvisning.

6 Uppföljning/utvärdering

Uppföljning görs av förskrivande läkare efter högst tre månader. Vid långtidsbehandling årlig kontakt.

7 Dubbelutrustning

Endast om båda benen behandlas samtidigt.

8 Kostnadsansvar

Förskrivande enhet.
Systemet består av en pump och stövel som beställs separat.