

Checklista vaccinationer

COVID -19 VACCIN

För individer 5 år och äldre gäller en dos som primärvaccination sedan 1 oktober 2023, med undantag för individer med allvarligt nedsatt immunförsvar.

Rutin: <https://www.regionjh.se/rest-api/centuri/document/60685>

Ålder på patienten

6 mån - 30 år - ge endast Pfizer Comirnaty
31 år och äldre– alla Covid-19 vaccin kan användas

Personalvaccination

Ingår inte i rekommenderade grupper

<https://www.regionjh.se/rest-api/centuri/document/78686?srcformat=true>

INFLUENZA VACCIN

Rätt målgrupp enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ?

Finns ordination?

Ska vaccinationen faktureras?

Vaccination mot säsongsinfluensa är kostnadsfri för riskgrupper som rekommenderats vaccination enl FOHMs riktlinjer inklusive hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Patienter som inte tillhör riskgrupp och är yngre än 65 år faktureras i efterhand. Utomlänspatienter faktureras hemlandstinget.

Rutin: <https://www.regionjh.se/rest-api/centuri/document/64926>

Personalvaccination

Kommunerna faktureras i efterhand utifrån givna vaccinationer. Kostnadsfritt region/kommunanställd

PNEUMOKOCK VACCIN

Rätt målgrupp enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer?

Finns ordination?

Ska vaccinationen faktureras?

Vaccination mot pneumokocker är kostnadsfri för riskgrupper som rekommenderats vaccination enl. FOHMs riktlinjer.

Patienter som inte tillhör riskgrupp och är yngre än 65 år faktureras i efterhand. Utomlänspatienter faktureras hemlandstinget.

Rutin: <https://regionjh.se/rest-api/centuri/document/37168>

Personalvaccination

Ingår inte i rekommenderade grupper

Folkhälsomyndighetens rekommendation hösten 2024 gällande Covid-19 och Influensa vaccination

Grupper	Covidvaccin	Minsta tid sedan senaste dos	Influensavaccin
80 år och äldre. 65 år och äldre med SÄBO/hemsjukvård alt med dagliga insatser av hemtjänst	Höst och <u>vårdos</u>	3 mån	Ja (<u>Efluelda</u> 60 år och äldre inom SÄBO/hemsjukvård)
65-79 år samt personer 18-64 år med riskfaktor annan än isolerad hypertoni	<u>Höstdos</u>	3 mån	Ja
Gravida efter graviditetsvecka 12	<u>Höstdos</u>	En dos efter v 12	Ja
18-64 år med hypertoni som enda riskfaktor	Nej (B)	3 mån	Nej (A)

(A) Rekommenderas Influensavaccin om personal inom vård och omsorg eller hushållskontakt till person med kraftigt nedsatt immunförsvar. Övriga som önskar ta influensavaccin kan göra det mot en kostnad.

(B) Covid-19 vaccin mot kostnad och efter läkarordination, t ex hushållskontakt till någon i riskgrupp

Personer i rekommenderad grupp, som haft bekräftad covid-19 efter 1 augusti 2024, kan välja att avstå höstvaccination mot covid-19.

Riskfaktorer för att bli svårt sjuk av influensa och covid-19

65 år och äldre	
Kronisk hjärt-kärlsjukdom. Ej isolerad hypertoni	T ex kärlkramp, tidigare hjärtinfarkt, stroke
Kronisk lungsjukdom	T ex KOL, svår/instabil astma
Nedsatt lungfunktion, försämrad <u>hostkraft</u> , sekretstagnation	T ex extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar, flerfunktionshinder
Kronisk njur- leversvikt	
Diabetes <u>mellitus</u>	Typ 1 eller 2
Nedsatt immunförsvar*	Tex Downs syndrom, behandling med TNF-alfahämmare, höga doser kortison
Allmän sjuklighet	Skörhet/generellt nedsatt fysik, hälsa <u>pga</u> demens, psykisk sjukdom eller missbruk

* Antal doser/år avgörs av behandlande läkare vid allvarligt nedsatt immunförsvar



Rekommenderade grupper - Pneumokocker

Vaccination av vuxna och barn över 2 år med ökad risk för pneumokockinfektion

- Personer 65 år och äldre (födda 1959 eller tidigare)
- Vuxna och barn över 2 år med vissa kroniska sjukdomar:

- kronisk hjärtsjukdom
- kronisk lungsjukdom (exempelvis KOL och svår astma)
- tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation (exempelvis vissa kroniska neurologiska sjukdomar eller extrem fetma)
- kronisk leversjukdom
- kronisk njursvikt (exempelvis nefrotiskt syndrom)
- diabetes mellitus

- Svetsare (exempelvis svetsare utsatta för toxisk rök i arbetet)
- Rökare
- Personer med alkohol- eller drogmissbruk

- REVACCINATION EFTER 5 ÅR för personer i riskgrupp och alla över 65 år

Dessa grupper erhåller kostnadsfri vaccination
+ övriga grupper kostnadsfria - se stora rutinen

<https://centuri/RegNo/37168>



Kombinerad vaccination

Vaccin	Det går kombinera flera vacciner, men fler än två bör inte ges till gravida
Vaxigrip Tetra® (Influensavaccin)	Standarddos influensavaccin (VaxigripTetra®) och vaccin mot covid-19 Bimervax : Bimervax är ett nytt covid-19 vaccin som ska separeras från andra vacciner med 7 dagar. Vaxigrip och Comirnaty kan ges till vuxna (inklusive gravida) vid samma tillfälle. Vaccinerna ges då på olika injektionsställen, helst andra armen eller benet. Det är också möjligt att ge Pneumokockvaccin samtidigt som de andra två, då ska de vacciner som ges i samma arm ges med minst 2 cm mellanrum. OBS: för gravida och sköra patienter högst 2 vacciner vid samma tillfälle
Pneumovax®, Prevenar13®, Prevenar 20 eller Apexxnar® (Vaccin mot pneumokocker)	Kan ges samtidigt som Vaxigrip Tetra och/eller samtidigt med vaccination mot covid-19 med mRNA-vacciner (Comirnaty eller Spikevax) till vuxna vid samma tillfälle. Se ovan. OBS: Bimervax är ett nytt vaccin och ska inte ges med andra vacciner.
Efluelda Tetra ® (Förstärkt Influensavaccin) Ges på SÄBO och i hemsjukvården till 65+	Förstärkt influensavaccin och vaccination mot covid-19 med Comirnaty kan ges till vuxna vid samma tillfälle. Förstärkt influensavaccin kan också ges tillsammans med Pneumovax. Fler än två vacciner samtidigt riskerar att ge mer biverkningar och detta ska särskilt beaktas hos sköra och äldre. OBS: Undantaget covid-19-vaccinet Bimervax där det behöver separeras med minst 7 dagar
Fluenz Tetra® (Influensavaccin, nasal administration)	Ges till barn äldre än 24 månader där behandlande läkare ordinerar. Levande försvagat vaccin. Vaccination mot covid-19 och influensa kan ske samtidigt även för barn

Vaccination med Covid-19 när tidigare given dos skett i annat land

Vacciner godkända av WHO som inte är registrerade inom EU (Sinovac/Coronavac, Sinopharm, Covishield och Covaxin).

- **En person som fått en dos av ett vaccin** godkänt av WHO men inte registrerat inom EU erbjuds **komplettering med en dos mRNA-vaccin eller *Nuvaxovid*** i Sverige. Vid vaccination av personer som är 30 år eller yngre används *Comirnaty*. Den kompletterande dosen dokumenteras som dos 2.
- Personer som är **vaccinerade med två doser av inaktiverade vacciner *Sinovac/Coronavac* eller *Sinopharm*** rekommenderas **kompletterande vaccination med en dos mRNA-vaccin eller *Nuvaxovid* utifrån ålder**. Dosen ges med minst 8 veckors intervall från föregående dos. Den kompletterande dosen registreras som dos 2."
- Vid osäkerhet om tidigare antal doser: Registrera påfyllnadsdos som dos 4.
- En dos räknas nu som grundvaccinering utom för barn 6 månader upp till och med 4 år samt personer med allvarligt nedsatt immunförsvar.

Dosera Comirnaty >12 år från vialer (6 doser/vial).

OBSERVERA att detta är Pfizers Comirnaty för >12 år. Andra doseringar gäller för barnvacciner och Nuvaxovid. Vissa vacciner ska spädas.

- Vänd ampullen sakta 10 gånger.
- Använd aseptisk teknik för att rengöra injektionsflaskans propp med en antiseptisk servett för engångsbruk.
- Dra upp 0,3 ml Comirnaty. Varje dos måste innehålla 0,3 ml vaccin.
- Om kvarvarande mängd vaccin i injektionsflaskan inte räcker till en full dos på 0,3 ml, kassera injektionsflaskan och resterande volym.
- Anteckna tillämpligt datum och tillämplig tidpunkt. Kassera allt oanvänt vaccin inom 12 timmar efter första punktion.

Vid hämtning av vialer/ampuller får kylkedjan aldrig brytas om ni inte använder vialerna inom 12 h. Om vaccinet inte ska användas inom 12 h ska det fraktas med kylväska med kylklamp.

