

Parasiter i faeces - Patientinstruktion egenprovtagning

Cystor, Maskägg, Cryptosporidier, Trofozoiter

Inför provtagningen behövs:

- Remiss; elektronisk (Cosmic-etikett) eller pappersremiss.

Det finns två olika provtagningskärl att välja på:

- Burk med gul kork, Para-Pak® SAF Fixative, Meridian Bioscience Inc.
- Burk med orange kork, StorAX SAF, Axonlab, REF AL0301.



Gör så här:

1. Märk faecesburken, ev. transporthylsa och remiss med namn, personnummer och provtagningsdatum.
2. Samla avföring på ett papper eller i ett rent kärl.
3. **Gul burk:** Använd medföljande sked som sitter fast i gula locket och fyll faecesburken så vätskan når upp till röda markeringen. Se bilden ovan.

Orange burk: Använd medföljande sked som sitter fast i orangea locket. Skopa i 2 st skedar med avföring ner i burken.

4. Stoppa tillbaka skeden i burken och skruva åt locket. Skaka om burken så att en emulsion bildas.
5. SAF innehåller formaldehyd, hantera provtagningskärlet med försiktighet. Vid hudkontakt skölj omedelbart med tvål och mycket vatten. Kontakta läkare omedelbart om symptom uppstår. Vid förtäring, ring en läkare eller giftinformationscentral omedelbart.



Hälssofarlig. Produkten kan ge ärftlig genetisk skada, cancer, fosterskador eller störa fortplantningen. Används också för produkter som ger allergi vid inandning, kemisk lunginflammation vid förtäring eller andra allvarliga skador vid enstaka eller upprepad exponering.



Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

6. Provet bör snarast lämnas till din hälsocentral, mottagning, vårdavdelning eller provinlämningen på Laboratoriemedicin.
7. Förvara ditt prov i rumstemperatur eller kylskåp (+2-8°C) i väntan på transport. Avföringsprovet får ej frysas.

Vid frågor ring: Mikrobiologen, telefon 063-15 36 25.