



Primärvårdsstandard vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel Regiondriven primärvård

Inkontinenshjälpmedel

Förskrivning av inkontinenshjälpmedel är en ordination som alltid ska föregås av en individuell utprovning och anpassas efter såväl personens behov som läckagemängd. Viktiga hänsynstaganden är: personens rörlighet, kroppsform, handfunktion, livsstil, dag/natt läckage, önskan om oberoende och sexualitet.

- Förskrivningen bör föregås av en basal utredning och utprovning vilket gäller såväl personer boende i enskilt boende vilka får sin förskrivning på sin vårdcentral som personer boende på särskilda boenden.
- Skriftlig och muntlig information om produktens användning, skötsel och hantering efter användning ska ges till patienten och/eller anhöriga.
- Förbrukningen beräknas enligt det faktiska behovet under tre månader, därefter ska uppföljning av funktion och komfort ske.
- Patienten bör uppmanas att via förskrivaren reklamera felaktiga produkter eller felaktigheter i samband med förskrivning och distribution.
- Ordination av inkontinenshjälpmedel ska dokumenteras med produktnamn, beräknad användning per dygn och förskriven mängd.

Referens

Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården, SOSFS 2008:1

Vårdprogram Region JH

Zamsyn inkontinens hos kvinnor

Zamsyn urininkontinens hos män

Ansvar för att lära ut RIK

Förskrivning av kostnadsfria inkontinenshjälpmedel

- Patient som fått hjälpmedel efter utredning av uroterapeut – titta i Web.sesam vad som är utskrivet så att patienten får samma
- Följ upphandlade artiklar i Web.sesam
- Skriv inte ut för längre tid än 3 månader