



Triagering på Hälsocentral och mottagning för att minska risk för smittspridning

När en patient söker vård behöver man beakta att den kan ha smittsamma sjukdomar.

Generella åtgärder som kan minska risken för smittspridning

- Så kort vistelse i väntrum som möjligt
- Möblera med så stort avstånd som möjligt
- Möbler bör vara avtorkningsbara och rengöras kontinuerligt (vid nyinköp är det ett krav att möbler ska vara avtorkningsbara)
- Leksaker bör minimeras, om det finns ska de rengöras med alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid. Rutin för vem som ansvarar för rengöring/desinfektion ska finnas.

Triageringsfrågor för att urskilja patienter med högre smittrisk

Frågorna ska alltid ställas vid bokning av besök om besöket sker samma dag annars vid ankomst.

Har Du något av följande:

- Nyttillkomna luftvägssymptom i form av hosta eller snuva?
- Nyttillkomna kräkningar eller diarré
- Utslag och feber?
- Känt bärarskap av någon smittsam sjukdom som riskerar att smitta andra såsom MRSA?

Åtgärder vid olika former av misstänkt smittsamhet

Vid luftvägssymtom (t.ex. covid-19, influensa, kikhosta eller RS-virus)

- Patienten tas till rum genom direktingång utifrån om det finns annars möts patienten upp och tas direkt in på ett rum.

- Patienten rekommenderas bära munskydd. Om det inte är möjligt bär personalen munskydd och visir.
- Avstånd på 2 meter bör alltid eftersträvas när så är möjligt.

Vid misstänkt smittsam diarré och/eller kräkning

Ex vinterkräksjuka, Clostridioides difficile

- Patienten med kräkning tas till rum genom direktingång utifrån om det finns annars möts patienten upp och tas direkt in på undersökningsrum.
- Egen toalett till rummet bör finnas.
- Utrymmen där patienten hade avföring/kräktes ska städas med virkon efter användning.
- Vid pågående kräkning bör personal bära munskydd.

Luftburen smitta

Ex tuberkulos, mässling, eller vattkoppor

- Patienter med misstänkt luftburen smitta bör inte komma in på Hälsocentraler/mottagningar förutom Infektionsmottagningen. Om möjligt ska patienter bedömas i ett hembesök, undersökas utomhus eller remittera direkt till Infektionskliniken.
- Vid misstänkt tuberkulos (TB) ska andningsskydd FFP3 bäras.
- Vid misstänkt vattkoppor eller mässling ska personal som inte har immunitet efter genomgången infektion eller vaccination bära andningsskydd FFP3.

Ett undersökningsrum med direktingång utifrån med egen toalett bör finnas på varje sjukvårdsenhet. Det är något som alltid ska tas med vid planering för om- eller nybyggnation.